

Профилактика употребления психоактивных веществ



Современная ситуация с употреблением ПАВ

- ⌚ Сегодня средний возраст знакомства детей с алкоголем составляет 12 лет.
- ⌚ Средний возраст приобщения к наркотикам по России составляет 14,5 лет.
- ⌚ Сегодня 50% выпускников школ России имеют табачную зависимость.

Классификация психоактивных веществ (ПАВ) и основные понятия

Все химические соединения растительного и синтетического происхождения, непосредственно влияющие на психическое состояние человека, принято называть психоактивными веществами.

Психоактивные вещества

Наркотические вещества:

героин;

кокаин;

анаша, марихуана;

психостимуляторы

Токсикоманические вещества:

растворители, клеи..;

реланиум, тазепам...;

циклодол, кетамин,...;

некоторые обезболивающие
препараты



Причины употребления ПАВ

Социальные:

- Неблагополучная семья
- Распространённость употребления ПАВ в социуме ребёнка
- Активная пропаганда в СМИ и неадекватная молодёжная политика
- Проживание в районах с низким материальным благополучием
- Отсутствие досуга


Психологические:

- Любопытство
- Неадекватная самооценка
- Попытка уйти от эмоциональных переживаний
 - Подчинение давлению группы

Наследственные:

- Наследственность, отягощённая психическими заболеваниями
- Наследственность, отягощённая наркологическими заболеваниями





Стадии формирования зависимости

Первые пробы. Они возможны из любопытства, стремления «стать как все», при определённом стечении обстоятельств.

Групповая зависимость. Она формируется по механизму условного рефлекса: приём вещества в обычных для этого условиях или в определённой компании.

Психическая зависимость. Появление потребности принимать ПАВ, чтобы вновь и вновь испытывать приятные ощущения.

Физическая зависимость. Включение химических соединений, входящих в состав ПАВ в обмен веществ и вызывающих состояния тревоги, злобности, агрессии.

Повышение толерантности к ПАВ. Такое состояние организма, когда отмечается всё менее выраженная ожидаемая реакция организма на определённую дозу вводимого препарата.



Следствия употребления ПАВ

- ∅ Высокий риск заболевания неизлечимыми болезнями.
- ∅ Среди лиц употребляющих ПАВ высокий процент смертности.
- ∅ Большая вероятность, что дети, родившиеся у человека имеющего зависимость, тоже обретут зависимость от ПАВ.



Общие признаки употребления ПАВ:

- ▶ Снижение интереса к учёбе, обычным увлечениям.
- ▶ Отчуждённость, скрытность и лживость.
- ▶ Эпизоды агрессивности, раздражительности, которые сменяются периодами неестественного благодушия.
- ▶ Компания подростка, зачастую состоит из лиц более старшего возраста и некоторые из них имеют опыт употребления ПАВ.
- ▶ Эпизодическое наличие крупных или небольших сумм денег непонятного происхождения.
- ▶ Изменение аппетита. Периодически тошнота, рвота.
- ▶ Сужение или расширение зрачков, состояние оглушиённости, заторможенности.
- ▶ Наличие следов инъекций на коже.





Этапы оказания первой помощи при передозировке ПАВ

- Вызвать «Скорую помощь»
- Повернуть на бок
- Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс
- Следить за характером дыхания до прибытия врачей.
- В случае замедления дыхания выполнить искусственное дыхание.